

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -4-2-74 710128

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 - 31130 BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

- Bulletin technique N° 3 -

29 Janvier 1974

ARBRES A FRUITS A NOYAU

Depuis le début de l'année, le temps est particulièrement doux et l'on observe déjà les premiers signes de débourrement des pêchers, amandiers et abricotiers notamment.

- Puceron vert du pêcher :

L'éclosion des "fondatrices" issues des oeufs d'hiver, commencée peu avant le 16 janvier, se poursuit à la faveur du temps anormalement clément pour la saison.

Dans les vergers où l'on redoute habituellement les dégâts de cet insecte (surveiller les arbres de bordure), on peut appliquer actuellement:

- soit de l'acétate de dinoterbe (Din-oil), à condition que le stade B ne soit pas dépassé ;

- soit l'association fluenetil + huiles (Lambrol) ou un D.N.O.C. seul ou additionné d'huile, dans tous les lieux ou sur les variétés pour lesquels le gonflement des bourgeons n'est pas commencé.

Ajoutons que l'acétate de dinoterbe et l'association fluenetil + huiles ont, en outre, une bonne action sur les oeufs d'araignées rouges.

Les oeufs du puceron vert du pêcher étant principalement déposés sur le bois de l'année précédente et surtout à l'extrémité des rameaux, le traitement doit être exécuté aussi parfaitement que possible de manière à toucher toutes les parties des arbres. Profiter d'une journée calme, sans vent.

- Puceron vert du prunier :

Ce puceron est très préjudiciable au développement printanier du prunier. Sous les piqûres de cet insecte, la jeune végétation est fortement perturbée, les pousses et feuilles restent petites, se déforment, les arbres gardant cet aspect rabougri longtemps après que les attaques ont cessé.

Le cas échéant, appliquer à ce puceron le traitement conseillé contre le puceron vert du pêcher.

- Cloque du pêcher (pêchers, nectarines, pavies) :

Nous rappelons que les infections se produisent à l'occasion des pluies à partir du moment où les bourgeons à bois s'entrouvent à leur extrémité (stade B) ; à ce moment, les bourgeons à fleurs sont nettement gonflés.

En conséquence, il y a lieu de surveiller les plantations afin d'intervenir quand les variétés parviennent au stade sensible.

Produits et doses efficaces :

- | | | |
|--------------------------------------|-------|---|
| - Zirame | 175 g | de matière active à l'hectolitre. |
| - Thirame (T.M.T.D.) | 175 g | " " " |
| - Captafol | 120 g | " " " |
| - Captane | 250 g | " " " |
| - Ferbame | 175 g | " " " |
| - Produits cupriques | 500 g | de cuivre métal à l'hectolitre : bouillie bordelaise, bouillie bourguignonne, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux, sulfate basique de cuivre. |
| - Association de zirame et de cuivre | | (dose homologuée). |

P./5.



Bourgeon s'allonge légèrement.



Au centre des écailles, on peut apercevoir la pointe verte ou rougeâtre de la première feuille en regardant par dessus.



La pointe verte s'allonge et se dégage légèrement des écailles. Elle est visible même lorsqu'on examine le bourgeon perpendiculairement à son axe.

Comme dans le cas du traitement dirigé contre le puceron vert, l'application doit être très soignée de façon à ce que le produit enrobe bien l'ensemble des rameaux.

- Monilia de l'abricotier :

Sur les variétés dont le rouge des sépales est visible (stade B), appliquer un produit cuprique à raison de 250 g de cuivre métal à l'hectolitre.

Les Ingénieurs chargés
des Avertissements Agricoles,
J. BESSON - E. JOLY

BALMA, le 29 Janvier 1974
Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"MIDI-PYRENEES",

P. TEISSEIRE

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.